

HOORNAAR (VESPA CRABRO L.)



Uiterlijk:


- Gele en zwarte dwarstekening op het achterlijf, kop en eerste segment achterlijf roodbruin tot donkerbruin
- Werksters ca. 1,7 tot 2,4 cm lang
- darren 2,1 tot 2,8 cm
- larven wit en pootloos

Ontwikkeling

- Eind april zet de koningin eitjes af
- Duur van ei tot volwassen dier 3 tot 5 weken, eerste werksters eind mei
- Werksters zorgen vanaf het begin voor broed in het nest en voor de nestbouw

Leefwijze:

- Leven in grote kolonies bij elkaar in een nest van wel 4000 bewoners
- werkster zijn onvruchtbaar, alleen de koningin legt eitjes
- De mannetjes (darren) alleen in augustus/september, zij bevruchten de nieuwe jonge koninginnen en sterven daarna.
- De jonge koninginnen overwinteren, de rest sterft bij de eerste nachtvorst.
- Voeding bestaat uit eiwithoudend en suikerhoudend voedsel, vooral voor het voeden van de larven
- Hoornaars leven ook van rupsen en spinnen die ze uitsuigen, hiermee voeden ze de larven.
- Voor bijen houders is een hoornaar schadelijk (steken de bijen dood en zuigen dan de honing uit de maag)



Het nest is te groot voor de dakrand.



Ingang van een hoornaars nest in de dakrand,
Het nest zat over de gehele lengte van het dakbeschot.
Er lagen in huis ongeveer 2000 hoornaars (dood).
Een natuurlijke dood gestorven, ze konden niet meer naar buiten.

Schade
/overlast:

- Kunnen hinderlijk zijn en soms pijnlijke steken toebrengen
- De hoornaar is “vriendelijker” dan de meeste wespesoorten, ze steken alleen als ze bekneld raken of als men ze aanraakt
- Hoofdbestanddeel van wespengif bestaat uit histamine en apitoxine, een steek is meestal ongevaarlijk behalve als het rechtstreeks in de bloedvat plaatsvindt of als men overgevoelig is voor deze giftige stoffen
- Wordt u gestoken en wordt u onpasselijk of duizelig, ga dan direct naar de huisarts, ziekenhuis of EHBO-post

Wering/
Preventie:

- Horren in open ramen en deuren, laat geen ramen dag en nacht open staan zonder horren.
- **DICHT NOOIT VliegOPENINGEN VAN HET NEST.**
- wespen zoeken een uitweg naar buiten.
- Als ze binnen zitten doe de ramen open, ze vliegen naar het licht.

Bestrijding:

- Bestrijding alleen noodzakelijk als er overlast is.
- Het nest kan achteraf na de bestrijding weg gehaald worden
- Met poedervormig insecticiden, de uitvliegopening behandelen