

## HUISKREKEL

*Acheta domestica* L.



### Uiterlijk:

Lengte volwassen dier 1,7 tot 2 cm excl. Antennen. Huiskrekels zijn gevleugeld (kunnen vliegen).

Hebben goed ontwikkelde achterpoten; kunnen 20 cm ver springen. Vrouwtjes hebben een 11 tot 15 mm lange legboor.

De larve van de huiskrekkel heeft hetzelfde uiterlijk als het imago, maar dan zonder vleugels

De kleur van de huiskrekkel is bruinegel met een bruine tot zwartbruine tekening

### Ontwikkeling:

Onvolledige gedaanteverwisseling.

Duur van ei tot volwassen dier bij 20 tot 23°C 6 tot 11 maanden (bij 26°C korter, namelijk 4 tot 5 maanden en bij hoge temperaturen (35°C) slechts 1 tot 2 maanden.

Volwassen vrouwtjes leggen per dag wel 70 tot 80 eitjes (in 5 weken tijd kan dat oplopen tot in totaal 700/1000 eitjes). De eitjes worden op warme, vochtige en donkere plaatsen afgezet

Levensduur naar schatting 1 tot 2 jaar.

### Leefwijze:

Lichtschuw, alleseter, komt vooral voor bij warmtebronnen, op afvalstortplaatsen en in Gebouwen (bakkerijen), vroeger in steenbakkerijen.

Mannetjes sjirpen luid en zeer hinderlijk De huiskrekkel eet voornamelijk zacht, plantaardig en dierlijk voedsel. Kannibalisme komt ook voor.

N.B. Huiskrekels kunnen 10 tot 20 dagen zonder voedsel in leven blijven.

Voorkeur voor een temperatuur van 26°C, onder 20° is de huiskrekkel niet actief.

Komen veelvuldig voor in de bio-industrie (varkens en kippenschuren)



### Wering/ Preventie:

Naden en kieren dichtn i.v.m. schuilplaatsen. Ook de ruimten rondom afvoer- en verwarming buizen, ventilatieopeningen voorzien van vliegengaas.

Door een zorgvuldige hygiëne voedselbronnen ontnemen, levensmiddelen koel opslaan

Afvalstortplaatsen afdekken met zand (ca. 30 cm). Etensoverblijfselen en keukenafval opruimen in goed afgesloten vuilnisemmers (bij voorkeur 's avonds en 's nachts buiten zetten).

Bestrijding: Bel voor een gedegen bestrijding met het bedrijf.