

VRUCHTMOT

Ploda interpunctella Hübner



Uiterlijk:

Lengte volwassen dier 1 tot 2 cm, spanwijdte 1,5 tot 2 cm. Een volwassen vruchtmot heeft roodbruine vleugels met witte tot geelachtige basis.

Ontwikkeling:

Volledige gedaanteverwisseling.

Duur van ei tot imago bij 25°C ca. 35 dagen, onder 13 tot 15°C geen ontwikkeling (Bij ongunstige omstandigheden, bijv. een lagere temperatuur, kan de ontwikkelingsduur van ei tot imago oplopen tot zo'n 315 dagen). Het vrouwtje legt in 1 tot 18 dagen ca. 500 eitjes, eitjes worden gelegd op allerlei voedingsmiddelen.

Leefwijze:

De eitjes worden gelegd op cacao, chocoladeproducten, granen, noten, gedroogde groenten, gedroogde vruchten, meel en andere plantaardige producten. De uit de eitjes komende larven voeden zich met bovengenoemde levensmiddelen de andere levensstadia tasten niets aan

Volgroeide larven verlaten het product en zoeken een geschikte plaats om zich te verpoppen. Dit kunnen naden en kieren zijn van kastjes en wanden van opslagruimten.

N.B. In leeg gekomen ruimten kunnen nog verschillende levensstadia van de motten aanwezig zijn.

Schade:

Verontreiniging van voedingsproducten e.d. door uitwerpselen, spinsels, dode motten en schimmels.

Wering/ Preventie:

Temperatuur in opslagruimten lager houden dan 13°C, leeggekomen ruimten goed schoonmaken. Voedingsmiddelen zo mogelijk in goede afsluitbare bussen bewaren. Aangestaste voorraden snel verwerken of vernietigen, oude voorraden eerst opgebruiken.

Bestrijding:

Voor particulieren die overlast hebben:

'Vergeten' voorraden in keukenkastjes verwijderen, denk ook aan droogbloemstukjes deze bevatten naast droogbloemen vaak ook voor de vruchtmotten aantrekkelijke noten.

